

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO

1359

**Em relação à queimadura elétrica, assinale a alternativa incorreta.**

- A - Alterações iniciais eletrocardiográficas não costumam ser frequentes, mas são usualmente graves.
- B - O julgamento da viabilidade muscular nas queimaduras elétricas é feito pela avaliação da cor e pelo grau de contratilidade muscular.
- C - Pacientes com queimaduras de alta tensão devem ser levados precocemente ao bloco cirúrgico para exploração da ferida e desbridamento.
- D - A incidência média de insuficiência renal aguda está entre 1,5 e 7,5%.

QUESTÃO

1360

**Em relação às pequenas queimaduras, é correto afirmar que:**

- A - O uso de agentes tópicos antimicrobianos no curativo previne e controla a infecção, favorecendo a cura das pequenas queimaduras.
- B - O uso de antibiótico sistêmico profilático diminui a incidência de infecção.
- C - É recomendado o resfriamento imediato da queimadura com água corrente ou soro fisiológico em torno de 10°C.
- D - O uso de sulfadiazina de prata a 1% acelera o processo de reepitelização.

QUESTÃO

1361

**Quanto ao paciente grande queimado, assinale a alternativa incorreta.**

- A - O acetato de mafenide é um inibidor da anidrase carbônica e pode causar acidose metabólica com hiperventilação compensatória.
- B - A excisão da escara queimada pode ser feita com segurança em até 25% da superfície corporal, ou em até 40% se for utilizado garroteamento das extremidades.
- C - Hipersensibilidade reacional com neutropenia é uma das complicações da sulfadiazina de prata.
- D - A cobertura das feridas com auto enxertos, alo enxertos ou substitutos sintéticos encurta o período de perdas metabólicas.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



- QUESTÃO** | **Com relação ao tratamento cirúrgico das queimaduras profundas, assinale a alternativa incorreta.**
- 1362** | **A** - A excisão tangencial deve ser executada em todas as áreas com suspeita de queimadura de terceiro grau.  
**B** - Uma área doadora de enxerto de pele pode ser utilizada mais de uma vez.  
**C** - O principal objetivo do tratamento cirúrgico das queimaduras profundas é a remoção da escara (tecido necrosado) e sua cobertura imediata.  
**D** - O tecido morto pela queimadura estimula resposta inflamatória e serve como meio de cultura para microorganismos patogênicos.
- QUESTÃO** | **A técnica de excisão tangencial para o tratamento de pacientes queimados foi primeiramente descrita por**
- 1363** | **A** - Morestin.  
**B** - Kurtin.  
**C** - McCurdy.  
**D** - Janzekovic.
- QUESTÃO** | **Com relação aos expansores teciduais, assinale a alternativa incorreta.**
- 1364** | **A** - A técnica é útil no tratamento de cicatrizes crônicas e sua utilização na correção de feridas abertas aumenta o índice de complicações.  
**B** - Infecção e deiscência são as complicações mais frequentes, mas seroma e deslocamento do expansor podem ocorrer.  
**C** - A cada sessão de expansão, devemos injetar até o paciente referir dor intensa ou até que a pressão intra expansor seja maior que 80 mmHg.  
**D** - No planejamento, deve se levar em consideração que nos membros inferiores a pele distende se mais lateralmente e menos longitudinalmente em relação ao membro.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO

1365

**Em relação ao melanoma maligno, assinale a afirmativa incorreta.**

- A - A presença do linfonodo sentinela positivo não tem relação com linfadenectomia loco regional.
- B - O subtipo superficial tem crescimento predominantemente horizontal e o subtipo nodular, predominantemente vertical.
- C - Em cerca de 20% dos casos, o melanoma aparece sobre um nevus melanocítico.
- D - O prognóstico da doença está diretamente ligado à espessura do tumor.

QUESTÃO

1366

**Uma zetaplastia de 60° produz um alongamento na cicatriz de**

- A - 25%.
- B - 100%.
- C - 75%.
- D - 50%.

QUESTÃO

1367

Paciente de 35 anos submetida há 20 dias a uma blefaroplastia inferior, evoluiu com hematoma no pós-operatório. No momento, apresenta ectrópio.

**Qual a melhor conduta?**

- A - Provavelmente houve ressecção exagerada de pele e a paciente necessita enxertia de pele.
- B - Indicar cantotomia com fixação do retináculo lateral ao periósteo da órbita.
- C - Cirurgia simples de cantopexia.
- D - Massagens locais e nova avaliação em pelo menos 30 dias.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO

Uma complicação grave em blefaroplastia é o hematoma retro orbitário.

1368

**Assinale a alternativa incorreta.**

A - Os principais sintomas são dor aguda, proptose severa, edema conjuntival e má oclusão palpebral.

B - A cantotomia lateral inferior é uma medida eficaz.

C - A pressão intra orbitária aumentada pelo hematoma pode levar à cegueira por isquemia do nervo óptico secundário à compressão dos

D - A melhor conduta é retirar as suturas, lavagem dos tecidos com SF 0,9% gelado e curativo oclusivo e compressivo.

QUESTÃO

Qual dos nervos abaixo é responsável pela hipoestesia temporária da ponta nasal após rinoplastia?

1369

A - Ramo medial do nervo nasopalatino.

B - Nervo etmoidal anterior.

C - Nervo supra orbitário.

D - Nervo infra orbitário.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



- QUESTÃO  
**1370**
- Qual dos seguintes nervos corresponde à inervação predominante da placa aréolo mamilar?**
- A - Quinto nervo intercostal lateral.
  - B - Terceiro nervo intercostal lateral.
  - C - Sexto nervo intercostal lateral.
  - D - Quarto nervo intercostal lateral.
- QUESTÃO  
**1371**
- Na fratura em *blow out* de órbita, a enoftalmia pode ser consequência dos mecanismos abaixo, exceto:**
- A - Hematoma retrobulbar.
  - B - Encarceramento muscular retroposicionando o globo ocular.
  - C - Escape de gordura orbital para o antro maxilar.
  - D - Aumento da capacidade volumétrica da órbita.
- QUESTÃO  
**1372**
- Mulher de 25 anos possui hipertrofia da perna direita. Ao exame físico a perna mostra edema, lesões de coloração vinho do porto e múltiplas trombozes dolorosas.
- Qual o diagnóstico mais provável?**
- A - Síndrome de Mafucci.
  - B - Síndrome de Park Weber.
  - C - Síndrome de Von Hippel Lindau.
  - D - Síndrome de Klippel Trenaunay.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO

1373

Em relação ao rinofima, assinale a afirmativa incorreta.

- A - A excisão tangencial é um método cirúrgico bastante empregado.
- B - Clinicamente, apresenta aumento bulboso e assimétrico do nariz com eritema, telangiectasias e sulcos.
- C - O quadro histológico apresenta hipertrofia acentuada e hiperplasia das glândulas sudoríparas, proliferação fibrovascular da derme e acantose epitelial.
- D - O tratamento clínico é similar ao da acne vulgar.

QUESTÃO

1374

A cartilagem articular reveste os espaços nas articulações sinoviais.

**Sua nutrição depende**

- A - do osso subcondral.
- B - da associação dos vasos sanguíneos e do líquido sinovial.
- C - de pequenos vasos sanguíneos que perfuram a cartilagem.
- D - unicamente do líquido sinovial.

QUESTÃO

1375

**ANULADA**

No ciclo da marcha, o período de balanço terminal ou desaceleração é observado nos últimos \_\_\_\_ do ciclo.

- A - 14%
- B - 20%
- C - 8%
- D - 3%

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **A entidade patológica em que há uma luxação não traumática do Atlas que surge como um torcicolo adquirido é a síndrome de**

**1376**

- A - Grisel.
- B - Waternberg.
- C - Parsonage Turner.
- D - Fenton.

QUESTÃO | **A escoliose é definida como desvio lateral as coluna (deformidade tridimensional).**

**1377**

**A forma mais comum é a**

- A - congênita.
- B - traumática.
- C - idiopática.
- D - neuromuscular.

QUESTÃO | **Segundo a Classificação de Lenke para as escolioses, a dupla torácica é o:**

**1378**

- A - Tipo 2.
- B - Tipo 4.
- C - Tipo 3.
- D - Tipo 1.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **Na semiologia do ombro, o teste de Gerber é utilizado para testar o**

**1379**

- A - infraespinal.
- B - redondo menor.
- C - subescapular.
- D - supraespinal.

QUESTÃO | **Na investigação da crepitação escapulotorácica, o exame radiográfico**

**1380**

- A - não precisa ser realizado.
- B - é feito em apenas uma incidência.
- C - costuma ser negativo já que a anatomia é normal na maioria dos casos.
- D - permite descartar os osteocondromas.

QUESTÃO | **Com relação ao tratamento cirúrgico da síndrome do túnel cubital, a técnica relacionada ao maiores índice de complicações é a**

**1381**

- A - transposição anterior no plano intramuscular.
- B - transposição anterior no plano subcutâneo.
- C - descompressão in situ.
- D - transposição anterior no plano submuscular.



**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | A sindactilia é uma das deformidades congênitas mais frequentes.

**1382**

**Os dedos mais acometidos são:**

- A - O dedo médio e o anular.
- B - O anular e o quinto dedo.
- C - O polegar e o indicador.
- D - O indicador e o dedo médio.

QUESTÃO | **No tratamento cirúrgico da contratura de Dupuytren, a técnica de McCash tem como objetivo principal**

**1383**

- A - permitir cobertura cutânea adequada.
- B - a exposição completa da fáscia acometida.
- C - evitar lesão dos pedículos digitais.
- D - evitar a formação de hematoma.

QUESTÃO | O encondroma é o tumor ósseo mais comum da mão.

**1384**

**Sua localização mais frequente é na/o**

- A - falange média.
- B - metacarpiano.
- C - falange distal.
- D - falange proximal.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO  
**1385**

Na artroscopia de punho, o portal mais utilizado e o primeiro a ser acessado na maioria dos procedimentos é o

A - 1 2.  
B - 4 5.  
C - 6R.  
D - 3 4.

QUESTÃO  
**1386**

A paralisia de Klumpke se caracteriza pelo acometimento das raízes de:

A - C5 C6 C7 C8 T1  
B - C5 C6  
C - C5 C6 C7  
D - C8 T1

QUESTÃO  
**1387**

As causas da displasia de desenvolvimento do quadril (DDQ) são multifatoriais.

**Com relação à apresentação pélvica podemos afirmar que:**

A - Não tem associação com DDQ.  
B - Só aumenta a incidência de DDQ em RN pré termo.  
C - Aumenta a incidência de DDQ em 2 vezes.  
D - Aumenta a incidência de DDQ em mais de 10 vezes.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **A doença de Legg Calvé Perthes é mais comum em \_\_\_\_\_ e na população \_\_\_\_\_.**

**1388**

- A - meninas / branca
- B - meninas / negra
- C - meninos / negra
- D - meninos / branca

QUESTÃO | **O agente causador de infecções agudas na mão que provoca dermonecrose e aparência de mordida de aranha é o:**

**1389**

- A - *Streptococcus*  $\beta$  hemolíticos.
- B - *Staphylococcus aureus* metilina resistente (MRSA).
- C - *Actinomyces israelii*.
- D - *Clostridium perfringens*.

QUESTÃO | **Das variações anatômicas do semilunar, a que está relacionada com o desenvolvimento da doença de Kienbock é o:**

**1390**

- A - Tipo II de Antuna Zapico.
- B - Padrão de vascularização em
- C - Tipo III de Antuna Zapico.
- D - Padrão de vascularização em

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



- QUESTÃO** | Segundo a classificação de Doyle, o descolamento epifisário em crianças é o dedo em martelo tipo
- 1391** | A - IVC.  
B - IVA.  
C - III.  
D - IVB.
- QUESTÃO** | O tipo II de Fernandez, para a fratura distal do rádio, corresponde a:
- 1392** | A - Fraturas do tipo compressão da superfície articular com impacção subcondral.  
B - Fraturas do tipo avulsão.  
C - Fraturas extra articulares.  
D - Fraturas de Barton ou chofer.
- QUESTÃO** | Nas não consolidações do escafoide com absorção mínima da cortical anterior e esclerose de menos de 2 mm, confirmada por tomografia, está indicado:
- 1393** | A - Fixação com enxertia estruturada.  
B - Fixação percutânea.  
C - Conduta expectante e somente iniciar o tratamento se houver sintomas.  
D - Tratamento com gesso.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO  
**1394**

**No processo de alongamento ósseo por distração a consolidação óssea ocorre:**

- A - No dobro do tempo do alongamento para crianças.
- B - No triplo do tempo do alongamento para qualquer paciente.
- C - Somente após confirmação radiológica, não tendo relação com tempo de alongamento.
- D - Imediatamente após o término do alongamento.

QUESTÃO  
**1395**

**Na classificação AO o tipo que equivale a fratura de Barton reversa é**

- A - B2.
- B - C2.
- C - B3.
- D - B1.

QUESTÃO  
**1396**

**A fratura da fossa lunar do rádio distal conhecida como “Die Punch” é classicamente representada pela depressão do seu aspecto:**

- A - Volar.
- B - Radial.
- C - Dorsal.
- D - Central.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **No reimplante do polegar, quando não é possível fazer o reparo primário do nervo digital e há necessidade de enxerto, a fonte doadora ideal é o nervo**

**1397**

- A - sural.
- B - cutâneo medial do antebraço.
- C - digital ulnar do dedo anular.
- D - interósseo posterior.

QUESTÃO | **Na síndrome compartimental, em condições de isquemia total, alterações irreversíveis ocorrem nos nervos após**

**1398**

- A - 8 horas.
- B - 4 horas.
- C - 6 horas.
- D - 2 horas.

QUESTÃO | **Na hanseníase, podemos afirmar que:**

**1399**

- A - As lesões nervosas regridem após a eliminação das bactérias.
- B - O período de incubação usual é de até 7 anos.
- C - 90% das pessoas expostas ao agente etiológico desenvolvem a infecção.
- D - As alterações cutâneas acontecem antes da perda de sensibilidade.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **A espessura máxima da epiderme e derme é atingida, respectivamente, na**

**1400**

- A - puberdade e quarta década.
- B - puberdade e infância.
- C - infância e quinta década.
- D - quinta década e puberdade.

QUESTÃO | **Nos tumores de pele, pode se dizer que o siringoma condroide:**

**1401**

- A - Na forma benigna pode metastatizar.
- B - Na forma benigna, limita-se a uma pequena lesão.
- C - Na forma maligna, espera-se metástase, mas não recorrência.
- D - É mais comum no sexo masculino do que no feminino.

QUESTÃO | **A sutura epitendínea no reparo das lesões dos tendões flexores:**

**1402**

- A - Objetiva exclusivamente evitar possíveis regiões de aderência.
- B - Aumenta a resistência à tração.
- C - Tem finalidade estética.
- D - Tem como objetivo primário orientar a sutura dos cotos.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **O pedículo do retalho do músculo serrátil anterior, quando elevado a partir da artéria subescapular, alcança medidas de até**

**1403**

- A - 20 cm.
- B - 10 cm.
- C - 15 cm.
- D - 5 cm.

QUESTÃO | **O uso de antibióticos perioperatórios se mostra necessário em procedimentos eletivos limpos com duração a partir de**

**1404**

- A - 1 hora.
- B - 30 minutos.
- C - 6 horas.
- D - 2 horas.

QUESTÃO | **Quanto ao tumor glômico, podemos afirmar que:**

**1405**

- A - É um hamartoma vascular benigno.
- B - Afeta exclusivamente a polpa digital.
- C - É lesão solitária.
- D - Leva a intolerância ao calor.



**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **A infecção aguda mais comum da mão é a(o)?**

**1406**

- A - Flegmão.
- B - Celulite.
- C - Paroníquia.**
- D - Tenossinovite purulenta.

QUESTÃO | **O suprimento sanguíneo do retalho grande dorsal vem diretamente da artéria**

**1407**

- A - toracodorsal.**
- B - circunflexa posterior do úmero.
- C - subescapular.
- D - circunflexa da escápula.

QUESTÃO | **A morte dos elementos germinativos da epiderme ocorre nas queimaduras de grau:**

**1408**

- A - II e III.
- B - I.
- C - III.**
- D - II.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **Na semiologia ortopédica, o teste de Ober identifica:**

**1409**

- A - Contratura em flexão do quadril.
- B - Insuficiência do glúteo médio.
- C - Instabilidade e lassidão do quadril.
- D - Contratura em abdução do quadril.

QUESTÃO | A infecção é uma das complicações da artroplastia do quadril.

**1410**

**Sua incidência relatada é de \_\_\_\_\_ nas artroplastias primárias e \_\_\_\_\_ nas revisões.**

- A - 3 a 5% / 5 a 10%
- B - 1 a 2% / 3 a 4%
- C - 0,5 a 1% / 1 a 2%
- D - 0,1 a 0,5% / 0,5 a 1%

QUESTÃO | **Com relação ao cisto de Baker, podemos afirmar que:**

**1411**

- A - O tratamento cirúrgico é a regra.
- B - A etiologia é, em sua maioria, traumática.
- C - A maioria apresenta regressão espontânea.
- D - É frequente no primeiro ano de vida

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | A diacereína faz parte do arsenal terapêutico da osteoartrose do joelho.

**1412**

**Seu efeito adverso mais comum é:**

- A - Aumento dos níveis pressóricos.
- B - Prurido cutâneo.
- C - Diarreia.
- D - Sonolência.

QUESTÃO | A fascíte plantar é afecção ortopédica muito comum.

**1413**

**Sobre ela podemos afirmar que**

- A - o pé cavo e o pé varo são fatores predisponentes.
- B - a dor ocorre principalmente no final do dia.
- C - a maioria dos pacientes apresenta melhora após 3 meses.
- D - a população masculina é a mais acometida.

QUESTÃO | **Em relação à coxartrose é correto afirmar que**

**1414**

- A - em geral a dor é referida na face externa da coxa e do joelho.
- B - o encurtamento do membro é sempre aparente.
- C - o exame radiográfico nunca evidencia cistos e geodos.
- D - no exame físico a marcha antálgica pode ser do tipo Trendelemburg ou do tipo Duchene.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO | **A realização de radiografias nos planos AP, P e transoral permite o diagnóstico de \_\_\_\_\_ das fraturas da coluna cervical.**

**1415**

- A - 50%
- B - 84%
- C - 99%
- D - 32%

QUESTÃO | **A medida intracompartimental em repouso é de**

**1416**

- A - 15 a 30 mmHg.
- B - 30 a 40 mmHg.
- C - 0 a 8 mmHg.
- D - 8 a 15 mmHg.

QUESTÃO | **O retalho de Moberg é usado em falhas de cobertura não muito extensas no polegar.**

**1417**

**Seu fechamento é facilitado, principalmente, por:**

- A - Dissecção extensa do complexo flexor.
- B - Tração cutânea.
- C - Sutura com fios de alta resistência.
- D - Flexão da falange distal.

**CADERNO DE PROVA  
RESIDENCIA MÉDICA – CIRURGIA DE MÃO -  
2021**



QUESTÃO

1418

A epitelização espontânea da zona doadora nos casos de enxerto de pele de espessura parcial ocorre em

- A - 1 semana.
- B - 2 a 3 semanas.
- C - 8 semanas.
- D - 4 semanas.